

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION CENTRE

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Bulletin technique n° 05 du 09/03/2000 - 2 pages

## Grandes Cultures

### Colza

**Stade** : C2-D1 à D2-tige  
20 cm selon les dates de  
semis et variétés.

### Ravageurs

- **Charançon de la tige**  
(*Ceuthorrhynchus napi*) :  
des captures importantes  
ont été faites cette semaine  
(voir tableau ci-contre).  
Le premier charançon a été  
capturé dans l'Eure et Loir  
à Flacey.

**Le stade limite de sensibilité est tige 20 cm, il est atteint dans certains secteurs. En l'absence de méligèthe, il n'est plus nécessaire de traiter. Dans les autres cas, il faut intervenir.**

- **Méligèthes** : elles sont  
nuisibles du stade D1 au  
début de la floraison.

**Seuil d'intervention :**

- 1 méligèthe par inflorescence au stade D1-D2,  
- 2 à 3 méligèthes par  
inflorescence au stade E  
(boutons écartés).

**Les pyréthrinoïdes ayant une persistance d'action d'environ 15 jours, n'oubliez pas d'en tenir compte si vous êtes déjà intervenus contre les charançons. Suivez vos cuvettes pour définir la fin du vol.**

- **Baris** : des captures ont été observées  
dans le Cher et l'Indre et Loire.

**Il n'est pas nécessaire d'envisager de lutte contre cet insecte car il est peu nuisible.**

### Maladies

#### Pour info

Du pseudocercosporiella est présent dans  
l'Indre et Loire (Auzouer, Noyant de Touraine)  
mais les intensités d'attaques sont faibles.

**En l'absence de forte attaque de cylindrosporiose ou de pseudocercosporiella, un fongicide à ce stade n'a pas d'utilité technique ni économique.**

### Captures d'insectes sur colza

Dpt	Lieu	Méligèthes	C. napi	C. quadridens
18	Bourges	12	16	9
	Civray	0	10	6
	Lapan	0	6	6
	Méry es Bois	15	16	0
	Oizon	18	16	0
	Presly	70	10	0
	Rians	2	10	0
	Sancergues	0	5	0
	Vailly/Sauldre	0	8	0
28	Flacey	0	1	1
36	Bouges le Château	0	0	0
	Meunet/Vatan	10	1	0
	Mâron	0	1	3
	Reclainville	0	0	2
	Vouillon	2	2	5
37	Autrèche	31	25	28
	Auzouer	21	14	9
	Brizay	3	8	0
	Chambourg	3	47	3
	Chanceaux/Choisille	5	1	0
	Chaveigne	15	10	9
	La Chapelle Blanche	8	3	2
	Noyant de Touraine	2	6	2
45	Amilly	18	6	0
	Férolles	27	6	7
	Gy les Nonains	7	2	0
	St Loup de Gonois	2	4	0
	Villamblain	0	3	0

**sporella, un fongicide à ce stade n'a pas d'utilité technique ni économique.**

### Blé

**Stade** : début redressement à épi 1 cm.

### Piétin-verse

La maladie est plus précoce que l'année dernière (voir graphe et tableau page 2). Des symptômes au champ sont visibles et atteignent le seuil de traitement (6 pieds sur 40, soit 15 %) dans des parcelles « à risque ».

Cependant, il n'est pas utile de traiter avant le stade épi 1cm : en effet, le traitement n'est pas efficace à 100 % et

### Colza

Fin d'intervention contre le charançon de la tige.

**Méligèthes** : captures importantes.

### Blé

**Piétin-verse** : à suivre. infos du modèle.

des recontaminations tardives sont possibles en cas de printemps humide (voir avec la persistance du produit). Si le temps sec se poursuit, il peut freiner le développement de la maladie.

**Visitez vos parcelles, d'autant plus qu'elles sont à**

**risque piétin-verse (semis précoce, fréquence élevée de blé dans la rotation, limon battant, pailles contaminées en surface).**

**Une intervention piétin-verse ne se justifie pas en-dessous de 6 pieds sur 40 touchés.**

**Piétin-verse : % de pieds touchés**

Dpt	Lieu	Variété	Stade	% Pieds touchés
18	Méry es bois		début redressement	0
	Aubigny 1		début redressement	0
	Aubigny 2		début redressement	50
	Ennordres 1		début redressement	7,5
	Ennordres 2		début redressement	12,5
	Oizon 1		début redressement	0
	Oizon 2		épi 1 cm	22,5
37	Autrèche	Taldor	épi 0,7-0,8 cm	32,5
	Auzouer	Altria	épi 0,5-0,6 cm	5
	Chambourg	Isengrain	épi 0,7-0,8 cm	7,5
	Courcoué	Aztec	épi 0,5-0,6 cm	17,5
	La Chapelle Blanche	Cézanne		5
	Noyant de Touraine	Soissons ou Altria	début redressement	12,5
	Pouzay	Valoris	épi 0,8 - 1cm	7,5
	St Ouen les Vignes	Isengrain	épi 1 cm	25
45	Chantecoq	Scipion	épi 0,48 cm	8
	Gidy	Texel	épi 0,5 cm	32,6
	Gy les Nonains	Dinghi	début redressement	0
	Poilly lez Gien	Soissons	fin tallage	0
	Poilly lez Gien	Charger	épi 0,56 cm	0
	St Maurice/Aveyron 1	Charger	fin tallage	4
	St Maurice/Aveyron 2	Charger	épi 0,48 cm	0
	Treilles	Cézanne	épi 0,62 cm	15
	Lorcy	Lloyd	épi 0,48 cm	0
	Gidy	Lloyd	épi 0,46 cm	17,4

## MODELE PIÉTIN-VERSE

**Dynamique de la maladie - Souches Rapides**

**FLEURY LES AUBRAIS (45) : levées du 19 octobre**

**choix de parcelles en risques importants**

